

ACTICOAT FLEX 7°

cu SILCRYST Nanocrystals

Pansament antimicrobian cu nanocristale de argint

 smith&nephew

Sterilizat cu radiati gamma. A nu se utilizeaza daca ambalajul este deschis sau deteriorat. De unica folosinta. A nu se resteriliza. A fi depozitat intr-un loc uscat (<25° C / 77° F). A se evita expunerea la temperaturi mai mari de 50° C / 120° F. A fi ferit de lumina.

Descriere

Pansamentul ACTICOAT® Flex 7 este alcătuit dintr-un strat de poliester flexibil cu un adeziv atraumatic, acoperit cu nanocristale de argint. ACTICOAT Flex 7 este un pansament foarte flexibil care urmărește linile corpului pentru a menține contactul cu suprafața plagi. Pansamentul are un adeziv atraumatic, astfel minimizând traumatizarea plagi în timpul schimbările acestuia. Nanocristalele de argint crează o barieră antimicrobiană eficientă față de contaminarea microbiană. Astfel plaga este protejată de microorganisme patologice invazive, fiindu-i grăbita vindecarea. Nanocristalele de argint sunt de asemenea eficiente împotriva microorganismelor prezente în plaga. Proprietatele de barieră antimicrobiană a pansamentului ACTICOAT Flex 7 raman eficiente minimum 7 zile.

Indicatii

ACTICOAT Flex 7 este indicat ca pansament cu bariera antimicrobiana pe plagi cu adâncimi diferite, precum arsuri, zone donoare și receptoare de transplant de piele, ulcerul de decubut, ulcerul varicos, ulcerul diabetic și plagi chirurgicale.

ACTICOAT Flex 7 poate fi folosit pe plagi infectate, caz în care acestea trebuie evaluate și tratate conform protocolului local. ACTICOAT Flex 7 poate fi folosit ca un strat de contact cu plaga în combinație cu NPWT (Negative Pressure Wound Therapy = terapie plagiilor prin presiune negativă) pana la 7 zile.

Contraindicații

A nu se utilizeaza la pacientii cu sensibilitate la argint.

A nu se utilizeaza la pacienti in timpul efectuarii RMN-ului.

A se indeparta anterior administrarii terapiei prin radiati. Dupa fiecare tratament poate fi aplicat un nou pansament.

Precautii

Strict pentru uz extern (a nu fi aplicat pe organe expuse).

ACTICOAT Flex 7 nu este compatibil cu produse pe baza de ulei precum vaselina.

Este posibil ca ACTICOAT Flex 7 sa nu fie compatibil cu agentii antimicrobieni locali.

Evitati contactul cu electrozi sau geluri conductoare în timpul masurărilor electronice (ex: EKG, EEG).

La aplicarea pansamentului ACTICOAT Flex 7 se poate simti o durere întranzitoare. Daca aceasta persista, inlaturati pansamentul. Pentru a atenua durerea, aplicati un pansament nou folosind un produs hidrogel, conform descrierii de mai jos. Daca durerea persista, inlaturati pansamentul si incetati tratamentul.

A se folosi ACTICOAT Flex 7 la prematuri (mai putin de 37 de saptamani de sarcina) doar atunci cand avantajele clinice sunt mai mari ca posibilele riscuri. Nu exista date clinice in aceasta grupa de varsta si de asemenea datele clinice privind tratamentele la nou-nascutii sunt limitate.

Instructiuni de folosire

Scateti pansamentul ACTICOAT Flex 7 din ambalaj folosind o tehnica aseptica.

Tiati pansamentul in forma necesara. Atunci cand este folosit cu bandaj compresiv, pansamentul trebuie tiat conform dimensiunilor plagi.

Pentru a umedi pansamentul, scufundati-l in apa distilata si storsceti-l usor (NU FOLOSITI SER FIZIOLOGIC). Inainte de aplicare lasati sa se scurge apa in exces. Ca alternativa la umezirea cu apa se poate folosi un strat subtire de produs hidrogel (ex: INTRASITE Gel) care poate fi aplicat direct pe plaga si/sau pe pansament.

Atunci cand este folosit cu terapie prin presiune negativa, materialul de umplere a plagi trebuie umedit si schimbat conform instructiunilor producatorului.

Fara a intinde pansamentul, aplicati ACTICOAT Flex 7 pe plaga, asigurandu-vă ca marginile nu sunt incorecte. Pansamentul trebuie aplicat astfel incat directia in care are elasticitate sa fie "in lungul" membrului, pentru a permite miscarea.

ACTICOAT Flex 7 poate fi folosit pentru a captusi plagi.

Fixati pansamentul ACTICOAT Flex 7 folosind benzi de fixare suplimentara sau terapie prin compresie care vor parsta un mediu umed in plaga. In cazul plagiilor cu un nivel mare de exudat se poate folosi un pansament absorbant secundar. ACTICOAT Flex 7 permite transferul exudatului direct in pansamentul absorbant secundar.

Pansamentul ACTICOAT Flex 7 trebuie pastrat umed, dar nu atat de umed incat sa permita macerarea pielii.

Schimbiati pansamentul in functie de nivelul de exudat si de caracteristicile plagi. Pansamentul poate fi mentionat pe plaga pana la 7 zile.

Atunci cand folositi ACTICOAT Flex 7 cu bandaj compresiv, verificati regulat intregul sistem de pansamente si schimbati-le doar daca exudatul a patrunt prin toate straturile. In cazul unui nivel mare de exudat este posibil sa fie necesar si un pansament absorbant non-occlusiv aditional.

In cazul in care pansamentul se usuca sau se lipeste de plaga, umeziti-l sau scufundati-l in apa pentru a ajuta indepartarea acestuia fara ca rana in proces de vindecare sa fie afectata.

Nota: Pansamentul ACTICOAT Flex 7 poate provoca decolorarea tranzitorie a pielii din jur.

Nota: Culoarea pansamentului poate varia dar acest lucru nu ii afecteaza performanta.

Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Disponibilitate
66800395	5cm x 5cm	Cutie de 5
66800397	10cm x 12.5cm	Cutie de 5
66800420	15cm x 15cm	Cutie de 5
66800400	20cm x 40cm	Cutie de 6
66800401	40cm x 40cm	Cutie de 6
66800545	2.5cm x 60cm	Cutie de 5

Producator

Produs in Marea Britanie de catre

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.

*Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2007

www.cica-care.com

Importator

Medical Ortovit srl * str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1

Telefon: (+40) 21 222.80.67 / 68 / 69 * 0724240285 * 0731493261

Fax: (+40) 21 222.80.72 * E-mail: office@ortovit.eu * Web: www.ortovit.eu

Magazin online www.ortovit.eu/magazin

